

李氏菌增菌肉汤 1（LB1）使用说明书

【货号】 CM505-05L1

【用途】

用于李斯特氏菌的增菌培养。（GB 标准）

【规格】 10mL/支*20

【成分】（g/L）

胰胨	5.0
多价胨	5.0
酵母膏	5.0
氯化钠	20.0
磷酸二氢钾	1.4
磷酸氢二钠	12.0
七叶苷	1.0

附加试剂：

萘啶酮酸	22.2mg /L
吡啶黄素	13.3mg /L

【pH 值】

7.2±0.2 (25℃)

【原理】

胰胨、多价胨和酵母膏在培养基中作为基础营养物质提供菌体生长所需的碳源、氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持体系渗透压平衡，李斯特氏菌可耐受较高含量的氯化钠，同时对肠球菌起抑制作用；磷酸二氢钾和磷酸氢二钾作为缓冲剂；七叶苷为可发酵的糖类；萘啶酮酸和吡啶黄为选择性抑菌剂。

【用法】

无菌环境下拆开包装，按照标准进行接种培养。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	方法	培养条件	质控结果
单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	10-100	半定量	30℃±1℃ 24h±2h	在 PALCAM 上> 10CFU,灰色至黑色菌 落，带有黑色晕环
单核细胞增生李斯特氏菌 CICC 25021 [CMCC(B) 54012]				

质控菌株	接种量 (CFU)	方法	培养条件	质控结果
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	1000-5000	半定量	30℃±1℃ 24h±2h	在 TSA 上<100CFU
大肠埃希氏菌 CICC 25012 [CMCC(B) 43201]				
粪肠球菌 ATCC 29212	1000-5000	半定量	30℃±1℃ 24h±2h	在 TSA 上<100CFU
粪肠球菌 CICC 25019 [CMCC(B) 32482]				

【保存】

2-25℃避光保存。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。